



**WE** *respect* **ANIMALS**

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER

## LISTA PRODUKTÓW LECZNICZYCH WETERYNARYJNYCH ZAREJESTROWANYCH I SPRZEDAWANYCH W POLSCE

BYDŁO

TRZODA CHLEWNA

KONIE

PSY

KOTY

ZWIERZĘTA FUTERKOWE

KRÓLIKI

DIAGNOSTYKA, INNE



**Szczepionki firmy Bioveta od wielu lat pomagają zapobiegać chorobom zwierząt w blisko 100 krajach pięciu kontynentów. Ich skuteczność zapewnia dobry wynik ekonomiczny na wielu fermach oraz poprawia stan zdrowia wielu pupili.**

Żeby produkować preparaty na najwyższym poziomie technologicznym, spółka Bioveta, a. s. inwestuje corocznie znaczne środki w badania i rozwój nowych preparatów oraz w nowe technologie.

Ważną częścią jakości obsługi naszych zwierzęcych pacjentów jest też odpowiednie stosowanie preparatów przez lekarzy weterynarii.

### **Zalecenia do prawidłowego stosowania:**

- stosować zgodnie z załączoną ulotką
- przed podaniem zapewnić powolne ogrzanie do temperatury pokojowej (wyjąć z lodówki 4 – 8 h przed zastosowaniem)
- mocno wstrząsnąć fiolką przed naciągnięciem roztworu do strzykawki
- dobrać odpowiedni rodzaj igły w zależności od dawki i miejsca podania
- nie używać brudnych igieł
- aplikować w miejsce określone w ulotce
- miejsce iniekcji musi być czyste i suche
- unieruchomić zwierzę na czas aplikacji



### BioBos Respi 2 intranasal

Żywa, donosowa szczepionka dla cieląt do czynnego uodporniania przeciwko BRSV i PI-3.

**Dawkowanie:** 2 ml donosowo (po 1 ml do każdego nozdrza) przy pomocy specjalnego aplikatora, od 10. dnia życia.

**Opakowanie:** 5 dawek.



### BioBos Respi 3

Inaktywowana szczepionka przeciwko infekcjom dróg oddechowych - BRSV, PI-3 i *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica*.

**Dawkowanie:** 2 ml s.c., od 8. tygodnia życia.

**Opakowanie:** 1 dawka, 5 dawek.



### BioBos Respi 4

Inaktywowana szczepionka przeciwko infekcjom dróg oddechowych BRSV, PI-3, *Mannheimia (Pasteurella) haemolytica* oraz wirusowej bieguncie bydła BVD.

**Dawkowanie:** 2 ml s.c., od 8. tygodnia życia.

**Opakowanie:** 1 dawka, 5 dawek.



### BioBos IBR marker inact.

Inaktywowana markerowa szczepionka do czynnej immunizacji bydła przeciwko zakaźnemu zapaleniu nosa i tchawicy (IBR).

**Dawkowanie:** 2 ml i.m., od 3. miesiąca życia.

**Opakowanie:** 5 dawek, 50 dawek.



### Kolibin RC Neo

Inaktywowana szczepionka przeciwko infekcjom wywołanym przez rotawirusy, koronawirusy i *E. coli* u nowonarodzonych cieląt.

**Dawkowanie:** 2 ml i.m., 7 - 5 tygodni oraz 4 - 2 tygodnie przed spodziewanym ociepleniem.

**Opakowanie:** 1 dawka, 5 dawek.



### TRICHOBEN AV

Awirulentna liofilizowana szczepionka przeciwko grzybiczy skórnej bydła wywołanej przez *Trichophyton verrucosum*.

**Dawkowanie:** cielęta od 1. dnia życia 2 ml i.m., bydło od 3. miesiąca życia 4 ml i.m.

**Opakowanie:** 10 ml, 40 ml.



### CLOTEID

Szczepionka do czynnego uodporniania koni, bydła, owiec, kóz i psów przeciwko tężcowi.

**Dawkowanie:** 1 ml i.m., od 3. miesiąca życia.

**Opakowanie:** 1 dawka.



### Oestrophan 0,25 mg/ml

Preparat hormonalny zawierający Klostrogenol o działaniu luteolitycznym.

**Dawkowanie:** 2 ml i.m. lub s.c.

**Opakowanie:** 10 amp. po 2 ml, fiołka 10 ml.



### Lineomam LC

Preparat do leczenia schorzeń gruczołu mlekowego u krów w laktacji, wywołanych przez bakterie wrażliwe na połączenia linkomycyny i neomycyny.

**Dawkowanie:** 1 aplikator co 12h (3x).

**Opakowanie:** 24 × 10 ml (1 aplikator), dodatkowo opakowanie zawiera 24 szt. chusteczek do dezynfekcji nawilżonych 65% roztworem izopropanolu.



### Biomec 10 mg/ml

Preparat do terapii i zapobiegania chorób pasożytniczych u bydła, owiec i świń – tj. nicianie żołądkowo-jelitowe, nicianie płucne, nicianie oczne, gzy, wszy, świerzbowce, wszolę.

**Substancja czynna:** iwermektyna 1%

**Dawkowanie:** 1 ml/50 kg m.c. s.c.

**Opakowanie:** 20 ml, 50 ml, 100 ml



### Rometa 20 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, psów i kotów.

**Substancja czynna:** ksyłazyna 20 mg/ml

**Dawkowanie:** 0,25 - 1,5 ml/100 kg m.c. i.m.

**Opakowanie:** 50 ml.



## TRZODA CHLEWNA



### Biosuis APP 2,9,11

Inaktywowana szczepionka do czynnej immunizacji tuczników przeciwko pleuropneumonii świń.

**Dawkowanie:** 1 ml i.m., od 6. tygodnia życia.  
**Opakowanie:** 10 dawek, 50 dawek, 100 dawek, 250 dawek.



### BIOSUIS M. hyo

Inaktywowana szczepionka przeciwko enzoootycznemu zapaleniu płuc świń wywołanemu przez *Mycoplasma hyopneumoniae*.

**Dawkowanie:** 2 ml i.m., po 10 dniu życia. W przypadku dużego ryzyka infekcji od 7. dnia życia.  
**Opakowanie:** 5 dawek, 50 dawek.



### Biosuis Parvo L (6)

Inaktywowana szczepionka przeciwko parwowirozie oraz leptospirozie świń.

**Dawkowanie:** 2 ml i.m., 4 - 5 tygodni przed kryciem lub pobraniem nasienia.  
**Opakowanie:** 5 dawek, 25 dawek.

NOWOŚĆ!



### BIOSUIS Respi E

Do czynnej i biernej immunizacji świń w celu zapobiegania różycy, zakażeniom wywołanym przez *Actinobacillus pleuropneumoniae* i *Haemophilus parasuis* (chorobie Glässera).

**Dawkowanie:** 1 ml i.m. u prosiąt, 2 ml u osobników dorosłych, od 6. tygodnia życia.  
**Opakowanie:** 100 ml.

NOWOŚĆ!



### Biosuis Salm

Inaktywowana szczepionka przeciwko odzwierzęcym serowarom *Salmonella* u świń.

**Dawkowanie:** 1 ml i.m.  
**Opakowanie:** 50 dawek.

NOWOŚĆ!



### BIOSUIS ParvoEry

Inaktywowana szczepionka przeciwko różycy i parwowirozie świń.

**Dawkowanie:** 2 ml i.m.  
**Opakowanie:** 5 dawek, 25 dawek, 50 dawek.

## TRZODA CHLEWNA



### ERYSINS SINGLE SHOT

Inaktywowana szczepionka przeciwko różycy świń wywołanej przez *Erysipelothrix rhusiopathiae* (szczepy serotypu 1 i 2).

**Dawkowanie:** 2 ml s.c., od 8. tygodnia życia.  
**Opakowanie:** 5 dawek, 25 dawek, 50 dawek, 125 dawek.



### Parvoerysin

Inaktywowana szczepionka przeciwko parwowirozie i różycy świń wywołanej przez *Erysipelothrix rhusiopathiae* (szczepy serotypu 1 i 2).

**Dawkowanie:** 2 ml i.m., 2 - 4 tygodnie przed kryciem.  
**Opakowanie:** 5 dawek, 25 dawek, 50 dawek.



### KOLISIN Neo

Inaktywowana szczepionka do czynnego uodparniania loch i loszek przeciw wystąpieniu kolibakterioz wywołanych przez szczepy *E. coli* u nowonarodzonych prosiąt. Prosięta są odporne na kolibakteriozę w okresie żywienia siałą oraz mlekiem matki.

**Dawkowanie:** 2 ml i.m.  
**Opakowanie:** 5 dawek, 25 dawek, 50 dawek.



### Biomec 10 mg/ml

Preparat do terapii i zapobiegania chorobom pasożytniczym u bydła, owiec i świń – tj. nicianie żołądkowo-jelitowe, nicianie płucne, nicianie oczne, gzy, wszy, świerzbowce, wszoły.

**Substancja czynna:** ivermektyna 1%  
**Dawkowanie:** 1 ml/33 kg m.c. s.c.  
**Opakowanie:** 20 ml, 50 ml, 100 ml



### Oestrophan 0,25 mg/ml

Preparat hormonalny zawierający kloprostenol o działaniu luteolitycznym.

**Dawkowanie:** Jednorazowa dawka 0,7 ml zastosowana od 111–113 dnia ciąży.  
**Opakowanie:** 10 amp. po 2 ml, fiołka 10 ml.

## TRZODA CHLEWNA



### Sergon 400 IU + 200 IU

Kombinacja dwóch hormonów gonadotropowych pobudzających rozwój i pękanie pęcherzyków jajnikowych dla loch i loszek.

Dawkowanie: 2 ml i.m. lub s.c.

Opakowanie: 1 dawka, 5 dawek.

## KOŃ



### CLOTEID

Szczepionka do czynnego uodparniania przeciw tężcowi koni, bydła, owiec, kóz i psów.

Dawkowanie: 1 ml i.m. od 3. miesiąca życia.

Opakowanie: 1 dawka.



### BioEquin H

Inaktywowana szczepionka przeciw herpeswirusowi koni typu 1 (EHV-1).

Dawkowanie: 1 ml i.m.

Opakowanie: 1 dawka.



### BioEquin FH

Inaktywowana szczepionka przeciwko grypie koni i herpeswirusowi koni typu 1 (EHV-1).

Dawkowanie: 1 ml i.m.

Opakowanie: 1 dawka.



### HYALURONAN 10 mg/ml

Produkt zawiera wysoce skuteczny kwas hialuronowy (niskocząsteczkowy, w stężeniu 10 mg/ml). Przeznaczony do stosowania ogólnego (dożylnie, podskórnie) oraz w okulistyce (do worka spojówkowego).

Dawkowanie: dożylnie (podskórnie): 6 ml, liczba dawek: 3 – 7, optymalnie 5; interwał pomiędzy dawkami 3 – 9 dni, optymalnie co 7 dni; miejscowo do worka spojówkowego: 1 - 2 krople co 2 - 12 godzin.

Opakowanie: 5 ampułek po 6 ml.

## KOŃ



### Rometar 20 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, psów i kotów.

Substancja czynna: ksylazyna 20 mg/ml

Dawkowanie: 3 – 5 ml/100 kg m.c. i.v.

Opakowanie: 50 ml.



### Narkamon 100 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów.

Substancja czynna: ketamina 100 mg/ml

Dawkowanie: 0,8 - 2,2 mg/kg m.c. i.v.

Opakowanie: 10 ml, 50ml.



### NALGOSED 10 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów.

Substancja czynna: butorfanol 10 mg/ml

Dawkowanie: 1 ml/100 kg m.c. i.v.

Opakowanie: 10 ml.



NOWOŚĆ!



### Biocan NOVEL Respi

Łagodzi objawy kliniczne oraz wydalanie bakterii po infekcji *Bordetella bronchiseptica* oraz po infekcji wirusem parainfluenzy u psów.

**Dawkowanie:** 0,5 ml, donosowo, od 3. tygodnia życia.

**Opakowanie:** 1 dawka.



### Biocan NOVEL Puppy

Złożona żywa atenuowana szczepionka do aktywnej immunizacji psów przeciwko wirusowi nosówki, oraz parwowirusowi psów typu 2a, 2b a 2c.

**Dawkowanie:** 1 ml s.c., od 6. tygodnia życia.

**Opakowanie:** 1 dawka.



### Biocan NOVEL DHPPi

Złożona szczepionka do aktywnej immunizacji psów przeciwko chorobom wywołanym przez wirus nosówki, parwowirus psów, adenowirus psów typu 1 i 2, wirus parainfluenzy psów.

**Dawkowanie:** 1 ml s.c. od 6. tygodnia życia.

**Opakowanie:** 1 dawka.



### Biocan NOVEL DHPPi/L4

Złożona szczepionka do aktywnej immunizacji psów przeciwko chorobom wywołanym przez wirus nosówki, parwowirus psów, adenowirus psów typu 1 i 2, wirus parainfluenzy psów, cztery serotypy bakterii *Leptospira*.

**Dawkowanie:** 1 ml s.c. od 8.–9. tygodnia życia.

**Opakowanie:** 1 dawka.



### Biocan NOVEL DHPPi/L4R

Złożona szczepionka do aktywnej immunizacji psów przeciwko chorobom wywołanym przez wirus nosówki, parwowirus psów, adenowirus psów typu 1 i 2, wirus parainfluenzy psów, cztery serotypy bakterii *Leptospira*.

**Dawkowanie:** 1 ml s.c. od 8.–9. tygodnia życia.

**Opakowanie:** 1 dawka.

### Biocan NOVEL Pi/L4

Złożona szczepionka do aktywnej immunizacji psów przeciwko chorobom wywołanym przez wirus parainfluenzy psów i cztery serotypy bakterii *Leptospira*.

**Dawka:** 1 ml s.c. od 6 tygodnia życia.

**Opakowanie:** 1 dawka.



NOWOŚĆ!



### Biocan NOVEL R

Inaktywowana szczepionka przeciwko wścieklźnie, zawiera szczep SAD Nvukovo-32.

**Dawka:** 1 ml s.c. od 12. tygodnia życia.

**Opakowanie:** 1 dawka, 10 dawek.



### Biocan Puppy

Żywa szczepionka przeciwko nosówce i inaktywowana przeciwko parwowirozie psów.

**Dawkowanie:** 1 ml s.c., od 5. tygodnia życia.

**Opakowanie:** 1 dawka.



### Biocan DP

Żywa atenuowana szczepionka przeciwko nosówce (CDV) i parwowirozie (CPV2).

**Dawkowanie:** 1 ml s.c., od 6. tygodnia życia.

**Opakowanie:** 1 dawka.



### Biocan C

Inaktywowana szczepionka przeciwko koronawirozie.

**Dawkowanie:** 1 ml s.c., od 5. tygodnia życia.

**Opakowanie:** 1 dawka.



### Biocan DHPPi

Żywa atenuowana szczepionka przeciwko nosówce, zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy, zakaźnemu zapaleniu wątroby, parwowirozie i parainfluenzy psów.

**Dawkowanie:** 1 ml s.c., od 6. tygodnia życia.

**Opakowanie:** 1 dawka.



### Biocan DHPPi+L

Żywa atenuowana szczepionka przeciwko nosówce, zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy, zakaźnemu zapaleniu wątroby, parwowirozie i parainfluenzie oraz leptospirozie (*L. icterohaemorrhagiae*, *L. canicola*, *L. grippityphosa*) psów.

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 8. tygodnia życia.

Opakowanie: 1 dawka.



### Biocan L

Inaktywowana szczepionka przeciwko leptospirozie (*L. icterohaemorrhagiae*, *L. canicola*, *L. grippityphosa*).

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 8. tygodnia życia.

Opakowanie: 1 dawka.



### Biocan DHPPi+LR

Żywa atenuowana szczepionka przeciwko nosówce, zakaźnemu zapaleniu krtani i tchawicy, zakaźnemu zapaleniu wątroby, parwowirozie i parainfluenzie, leptospirozie (*L. icterohaemorrhagiae*, *L. canicola*, *L. grippityphosa*) oraz wściekliznie.

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 12. tygodnia życia.

Opakowanie: 1 dawka.



### Biocan R

Inaktywowana szczepionka przeciwko wściekliznie, zawiera szczep SAD Vnukovo-32.

Dawkowanie: 1 ml s.c. lub i.m., od 3. miesiąca życia.

Opakowanie: 1 dawka, 10 dawek.



### Biocan M

Szczepionka przeciwko *Microsporium canis* u psów i kotów. Możliwość stosowania profilaktycznie oraz leczniczo.

Dawkowanie: 1 ml i.m., od 12. tygodnia życia.

Opakowanie: 1 dawka.



### CLOTEID

Do czynnego uodparniania koni, bydła, owiec, kóz i psów przeciwko tężcowi.

Dawkowanie 1 ml i.m., od 3. miesiąca życia.

Opakowanie: 1 dawka.



### Biocan B

Inaktywowana szczepionka przeciwko boreliozie wywoływanej przez *Borrelia afzelii*, *Borrelia garinii*.

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 12. tygodnia życia.

Opakowanie: 1 dawka.



### Borrelym 3

Inaktywowana szczepionka przeciwko wszystkim najbardziej patogennym serotypom *Borrelia spp.* – *Borrelia garinii*, *Borrelia afzelii*, *Borrelia burgdorferi sensu stricto*.

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 12 tygodnia życia.

Opakowanie: 1 dawka.



### FIPRON S, 67 mg

Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł (*Ctenocephalides spp.*) oraz leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS) u psów.

Zapobieganie i zwalczanie inwazji kleszczy (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*) oraz wszy (*Trichodectes canis*).

Substancja czynna: fipronil 67 mg

Dawkowanie: Podanie całej zawartości 1 tuby (0,67 ml) na psa o masie ciała od 2 do 10 kg; od 8. tygodnia życia.

Opakowanie: 1 dawka.



### FIPRON M, 134 mg

Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł (*Ctenocephalides spp.*) oraz leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS) u psów.

Zapobieganie i zwalczanie inwazji kleszczy (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*) oraz wszy (*Trichodectes canis*).

Substancja czynna: fipronil 134 mg

Dawkowanie: Podanie całej zawartości 1 tuby (1,34 ml) na psa o masie ciała od 10 do 20 kg; od 8. tygodnia życia.

Opakowanie: 1 dawka.





### FIPRON L, 268 mg

Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł (*Ctenocephalides spp.*) oraz leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS) u psów. Zapobieganie i zwalczanie inwazji kleszczy (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*) oraz wszy (*Trichodectes canis*).

Substancja czynna: fipronil 268 mg

Dawkowanie: Podanie całej zawartości 1 tuby (2,68 ml) na psa o masie ciała od 20 do 40 kg; od 8. tygodnia życia.

Opakowanie: 1 dawka.



### FIPRON XL, 402 mg

Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł (*Ctenocephalides spp.*) oraz leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS) u psów. Zapobieganie i zwalczanie inwazji kleszczy (*Rhipicephalus spp.*, *Dermacentor spp.*, *Ixodes spp.*) oraz wszy (*Trichodectes canis*).

Substancja czynna: fipronil 402 mg

Dawka: Podanie całej zawartości 1 tuby (4,02 ml) na psa o masie ciała powyżej 40 kg; od 8. tygodnia życia.

Opakowanie: 1 dawka.



### HYALURONAN 10 mg/ml

Produkt zawiera wysoce skuteczny kwas hialuronowy (niskocząsteczkowy, w stężeniu 10 mg/ml). Przeznaczony do stosowania ogólnego (dożylnie, podskórnie) oraz w okulistyce (do worka spojówkowego).

Dawkowanie: 3 – 5 ml s.c./i.v., liczba dawek: 3 – 7, optymalnie 5 w interwale co 3 – 9 dni, optymalnie co 7 dni; miejscowo do worka spojówkowego: 1 – 2 krople co 2 – 12 godzin.

Opakowanie: 5 ampułek po 6 ml.



### Rometar 20 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, psów i kotów.

Substancja czynna: ksylazyna 20 mg/ml

Dawkowanie: 0,05 - 0,1 ml/kg m.c. i. m.

Opakowanie: 50 ml.



### Narkamon 100 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów.

Substancja czynna: ketamina 100 mg/ml

Dawkowanie: 0,05–0,15 ml/kg m.c. i.m. lub i.v.

Opakowanie: 10 ml, 50 ml.



### NALGOSED 10 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów.

Substancja czynna: butorfanol 10 mg/ml

Dawkowanie: 0,02–0,03 ml/kg m.c. i.m., i.v. lub s.c.

Opakowanie: 10 ml.







### Biofel PCH

Inaktywowana szczepionka przeciwko panleukopenii, herpeswirozie i kaliciwirozie kotów.

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 8. tygodnia życia.

Opakowanie: 1 dawka.



### Biofel PCH R

Inaktywowana szczepionka przeciwko panleukopenii, herpeswirozie i kaliciwirozie oraz wściekliznie kotów.

Dawkowanie: 1 ml s.c., od 3. miesiąca życia.

Opakowanie: 1 dawka.



### Biocan R

Inaktywowana szczepionka przeciwko wściekliznie, zawiera szczep SAD Vnukovo-32.

Dawkowanie: 1 ml s.c. lub i.m., od 3. miesiąca życia.

Opakowanie: 1 dawka, 10 dawek.



### Biocan M

Szczepionka przeciwko *Microsporium canis* u psów i kotów. Do stosowania profilaktycznie oraz leczniczo.

Dawkowanie: 1 ml i.m., od 12. tygodnia życia.

Opakowanie: 1 dawka.



### FIPRON 50 mg SPOT-ON

Roztwór przeciwpasożytniczy zawierający *Fipronilum* 50 mg do nakrapiania dla kotów. Zapobieganie i zwalczanie inwazji pcheł (*Ctenocephalides felis*) oraz leczenie alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS) u kotów. Zapobieganie i zwalczanie inwazji kleszczy (*Ixodes spp.*) oraz wszy (*Felicola subrostratus*).

Substancja czynna: fipronil 50 mg

Dawkowanie: zawartość 1 tuby (0,5 ml) nanieść na skórę pomiędzy łopatkami, stosować u kotów o masie ciała powyżej 1 kg; od 8. tygodnia życia.

Opakowanie: 1 dawka.



## KOT



### HYALURONAN 10 mg/ml

Produkt zawiera wysoce skuteczny kwas hialuronowy (niskocząsteczkowy, w stężeniu 10 mg/ml). Przeznaczony do stosowania ogólnego (dożylnie, podskórnie) oraz w okulistyce (do worka spojówkowego).

**Dawkowanie:** 3 – 5 ml s.c./i.v., liczba dawek: 3 – 7, optymalnie 5; w interwale co 3 – 9 dni, optymalnie co 7 dni; miejscowo do worka spojówkowego: 1 – 2 krople co 2 – 12 godzin.  
**Opakowanie:** 5 ampułek po 6 ml.



### Rometar 20 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, bydła, psów i kotów.

**Substancja czynna:** ksylazyna 20 mg/ml  
**Dawkowanie:** 0,05–0,1 ml/kg m.c. i. m.  
**Opakowanie:** 50 ml.



### Narkamon 100 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów.

**Substancja czynna:** ketamina 100 mg/ml  
**Dawkowanie:** 0,05–0,15 ml/kg m.c. i.m. lub i.v.  
**Opakowanie:** 10 ml, 50 ml.



### NALGOSED 10 mg/ml

Roztwór do wstrzykiwań dla koni, psów i kotów

**Substancja czynna:** butorfanol 10 mg/ml  
**Dawkowanie:** 0,01–0,04 ml/kg m.c i.v, i.m. lub  
**Opakowanie:** 10 ml.

## ZWIERZĘTA FUTERKOWE:



### Mustelvac D

Żywa atenuowana monowalentna szczepionka przeciwko nosowce nerek i lisów.

**Dawkowanie:** 0,5 ml s.c., od 6. tygodnia życia.  
**Opakowanie:** 40 dawek, 200 dawek.



### Biocan R

Inaktywowana szczepionka przeciwko wściekliznie, zawiera szczep SAD Vnukovo-32.

**Dawkowanie:** 1 ml s.c. lub i.m., od 3. miesiąca życia.  
**Opakowanie:** 1 dawka, 10 dawek.



## KRÓLIK



### MYXOREN

Żywa atenuowana szczepionka zawierająca *Poxvirus myxomatosa* przeciwko myksomatozie królików.

**Dawkowanie:** 1 ml s.c., od 10. tygodnia życia (w razie dużej presji środowiska – od 4. tygodnia życia).

**Opakowanie:** 10 dawek.



### PESTORIN

Inaktywowana szczepionka zawierająca *Calicivirus septicaemiae haemorrhagiae cuniculi* (solution organorum) przeciwko wirusowej chorobie krwotocznej królików (pomorowi królików) typu 1.

**Dawkowanie:** 1 ml s.c., od 10. tygodnia życia (w razie trudnej sytuacji epizootycznej – od 6. tygodnia życia).

**Opakowanie:** 10 dawek.



### PESTORIN MORMYX

Szczepionka zawierająca *Calicivirus septicaemiae haemorrhagiae cuniculi*, *Poxvirus myxomatosa attenuatum* do aktywnej immunizacji przeciwko myksomatozie i wirusowej chorobie krwotocznej królików (pomorowi królików) typu 1.

**Dawkowanie:** 1 ml, s.c., od 10. tygodnia życia (w przypadku trudnej sytuacji epizootycznej – od 6. tygodnia życia).

**Opakowanie:** 1 dawka, 10 dawek.

NOWOŚĆ!



### PASORIN-OL

Inaktywowana szczepionka przeciwko pasterelozie królików.

**Dawkowanie:** 0,5 ml/1 ml, s.c., od 4. tygodnia życia.

**Opakowanie:** 20 ml, 100 ml.

## DIAGNOSTYKA, INNE



### AVITUBAL 28000

Preparat do pojedynczej tuberkulinizacji kur, indyków, świń oraz do porównawczej tuberkulinizacji bydła.

**Substancja czynna:** *Proteinum tuberculinum Mycobacterii avium* (szczep D 4 ER) 28000 IU.

**Dawkowanie:** 0,1 ml i.c.

**Opakowanie:** 2 ml.



### BOVITUBAL 28000

Preparat do rozpoznawania gruźlicy bydłej u bydła i świń poprzez wywołanie reakcji alergicznej typu późnego u zwierząt zakażonych *Mycobacterium bovis*.

**Substancja czynna:** *Proteinum tuberculinum Mycobacterii bovis* (szczep AN 5) – 28000 IU

**Dawkaowanie:** 0,1 ml i.c.


**Opakowanie:** 2 ml.





# Regionalni Przedstawiciele Naukowi

Produkty Bioveta a.s. zarejestrowane w Polsce dostępne są w hurtowniach weterynaryjnych na terenie całego kraju. Informacji technicznych i naukowych dotyczących produktów Bioveta a.s. udzielają przedstawiciele naukowi.



**WE** *respect* **ANIMALS**

VETERINARY MEDICAMENTS PRODUCER



**BIOVETA POLSKA Sp. z o.o.**  
Silesia Business park, building B,  
ul. Chorzowska 150, 40-101 Katowice

tel. +48 517 951 963  
info.polska@bioveta.eu  
www.bioveta.pl

**Tomáš Ganger**  
Country Manager

Tel. kom.: +48 517 951 963 PL,  
+420 778 768 054 CZ  
e-mail: ganger.tomas@bioveta.cz

## Region I

**lek. wet. Roma Buczkowska**

tel. 660 440 629, buczkowska.roma@bioveta.eu

**woj. kujawsko-pomorskie:** powiaty – Aleksandrowski, m. Bydgoszcz, bydgoski, gołubsko-dobrzyński, grudziądzki, chełmiński, inowrocławski, mogileński, nakielski, radziejowski, sępoleński, świecki, m. Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski, żniński; **woj. lubuskie:** powiaty – m. Gorzów Wlkp., gorzowski, międzyrzeczki, słubicki, strzelecko-dresdenecki, sulęciński, świebodziński; **woj. pomorskie;** **woj. wielkopolskie:** powiaty – czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, chodzieski, m. Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, m. Poznań, poznański, pilski, śłupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński, złotowski; **woj. zachodniopomorskie**

## Region II

**dr n. wet. Magdalena Marszałek**

tel. 502 919 237, marszalek.magdalena@bioveta.eu

**woj. kujawsko-pomorskie:** powiaty – brodnicki, lipnowski, rypiński, m. Włocławek, włocławski; **woj. mazowieckie:** powiaty – ciechanowski, gostyniński, legionowski, makowski, mławski, nowodworski, m. Ostrołęka, ostrołęcki, ostrowski, m. Płock, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, żuromiński; **woj. podlaskie;** **woj. warmińsko-mazurskie**

## Region III

**lek. wet. Aleksandra Matysiak-Wróbel**

tel. 797 344 701, matysiak\_wrobel.aleksandra@bioveta.eu

**woj. łódzkie:** powiaty – opoczyński, m. Piotrków Trybunalski, piotrkowski, rawski, m. Skierniewice, skierniewicki, tomaszowski; **woj. lubelskie;** **woj. mazowieckie:** powiaty – białobrzegi, garwoliński, grodziski, grójce, kozienicki, lipski, łosicki, m. Radom, radomski, miński, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, przysuski, m. Siedlce, siedlecki, sokołowski, sztygowski, m. St. Warszawa, zwoleniński, żyrardowski; **woj. podkarpackie:** powiaty – nizański, stalowowolski, m. Tarnobrzeg, tarnobrzegi; **woj. świętokrzyskie:** powiaty – konecki, opatowski, ostrowiecki, sandomierski, skarżyski, starachowicki;

## Region IV

**lek. wet. ANGELIKA ORLEWICZ**

+48 503 968 063, orlewicz.angelika@bioveta.eu

**woj. łódzkie:** powiaty – radomszczański; **woj. opolskie:** powiaty – głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, oleski, m. Opole, opolski, prudnicki, strzelecki; **woj. małopolskie;** **woj. podkarpackie:** powiaty – bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośniński, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, m. Krosno, mielecki, m. Przemyśl, m. Rzeszów, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski; **woj. śląskie;** **woj. świętokrzyskie:** powiaty – buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, m. Kielce, pińczowski, staszowski, włoszczowski;

## Region V

**lek. wet. MAŁGORZATA BUDZYŃSKA-GAZDOWICZ**

+48 503 968 053, budzynska\_gazdowicz.malgorzata@bioveta.eu

**woj. dolnośląskie;** **woj. łódzkie:** powiaty – bełchatowski, brzeziński, łaski, łęczycki, łowicki, m. Łódź, łódzki wschodni, kutnowski, pabianicki, pajęczanicki, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski; **woj. lubuskie:** powiaty – krośniński, nowosolski, wschowski, m. Z. Góra, zielonogórski, żagański, żarski; **woj. opolskie:** powiaty – brzeski, namysłowski, nyski; **woj. wielkopolskie:** powiaty – gostyński, grodziski, jarociński, m. Kalisz, kaliski, kępiński, kołski, kościański, krotoszyński, m. Leszno, leszczyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, śremski, turecki, wolsztyński;